




Angioplasty

قسطرة القلب وتوسيع الشرايين



Cardiac catheterization & angioplasty

What happens after a cardiac catheterization & angioplasty?

The length of the stay differs from cardiac catheterization to angioplasty. Angioplasty patients receive loading medications to be prepared for the procedure. After a successful angioplasty, the patient will be monitored for 24 hours. However, cardiac catheterization patients will usually be monitored for 2 hours, then the compression will be removed and you will be discharged home.

Please follow the below instructions:

- Take your prescribed medications as directed. (Do not discontinue them without consulting your doctor).
- Take shower but ensure the catheter's insertion area does not get wet for the first 24 to 48 hours.
- Drink plenty of fluids, unless otherwise advised by your doctor.
- Limit physical activity for the first 24-48 hours.
- Return to work in 2 to 3 days if you do not do heavy work.
- Keep a close watch on the catheter insertion site for any signs of infection or bleeding.

Please avoid the following:

- Lifting heavy objects or engaging in strenuous activities for at least 4 days
- Driving until your doctor confirms it is safe.
- Smoking and Alcohol.

Contact your doctor if you experience any of the following:

- Increase pain, swelling, redness, or discharge at the wound site.
- A change in color, coldness, or numbness in the leg or arm on the same side of the body where the catheter was inserted
- Non-stop bleeding from your wound even after applying pressure for 10 minutes.
- Chest pain or shortness of breath that does not improve with rest.

قسطرة القلب وتوسيع الشرايين angioplasty

ماذا يحدث بعد إجراء قسطرة القلب وزراعة stent في الأوعية؟

تختلف مدة الإقامة بين المريض الذي يخضع لعملية قسطرة القلب والذي يخضع لتوسيع الشرايين. يتلقى مرضى توسيع الشرايين أدوية تمهيدية قبل العملية. بعد إجراء توسعة الشرايين بنجاح، سيتم مراقبة المريض لمدة 24 ساعة. أما مرضى قسطرة القلب فعادةً ما يتم مراقبتهم لمدة ساعتين، ثم يتم إزالة الضغط والعودة إلى المنزل.

يرجى اتباع التعليمات التالية:

- تناول الأدوية الموصوفة كما هو مُحدد (لا تتوقف عن تناولها دون استشارة طبيبك).
- استحم، لكن احرص على عدم تعرض منطقة إدخال القسطرة للماء خلال الـ 24 إلى 48 ساعة الأولى.
- اشرب الكثير من السوائل، ما لم ينصحك طبيبك بغير ذلك.
- حدد من النشاط البدني خلال أول 24 إلى 48 ساعة.
- عد إلى العمل في غضون يومين إلى ثلاثة أيام إذا كان عملك لا يتطلب جهدًا بدنيًا شاقًا.
- راقب عن كثب موقع إدخال القسطرة لأي علامات عدوى أو نزيف.

يرجى تجنب ما يلي:

- رفع الأشياء الثقيلة أو القيام بأي نشاط شاق لمدة لا تقل عن 4 أيام.
- القيادة حتى يؤكد لك طبيبك أنها آمنة.
- التدخين والكحول.

اتصل بطبيبك إذا واجهت أيًا مما يلي:

- زيادة في الألم أو التورم أو الاحمرار أو خروج إفرازات من موقع الجرح.
- تغير في لون أو برودة أو خدر في الساق أو الذراع على نفس جانب الجسم حيث تم إدخال القسطرة.
- نزيف مستمر من الجرح حتى بعد الضغط عليه لمدة 10 دقائق.
- ألم في الصدر أو ضيق في التنفس لا يتحسن مع الراحة.