


Circumcision

الظهور



Circumcision care

You need to know that:

- It's typical to see a few drops of blood from the surgical wound. Bleeding often stops on its own or with a few minutes of gentle direct pressure.
- It usually takes 7 to 10 days for the penis to heal. The tip of the penis is likely to be sore at first. The penis might look discolored, swollen or bruised. You might notice a small amount of yellow fluid on the tip of the penis as well.

Please follow the instructions below:

- Assess the baby's pain level and provide comfort measures as needed such as swaddling, breastfeeding, skin-to-skin contact or administering analgesics as prescribed by the doctor.
- Monitor for the first void following circumcision that should occur within 6-8 hours after the procedure.
- Apply a small amount of healing ointment as prescribed by a physician to the circumcision site and cover it with a clean, sterile gauze dressing.
- Ensure that the diaper is applied loosely to avoid pressure on the circumcision site.
- Change the gauze dressing with each diaper change for the first 24-48 hours post-procedure or as directed by the physician.
- Clean the circumcision site gently with warm water during diaper changes. Avoid using soap or alcohol-based wipes, as these can cause irritation.
- Pat the area dry with a clean, soft cloth. Do not rub the site, as this may cause discomfort or disrupt healing.

Please avoid the following:

- Removing the gauze by force in case it sticks to the circumcision site and make a bath tub with warm water.

Please contact your doctor in case of any of the following:

- Increased redness
- Swelling
- Unpleasant odor
- High temperature

العناية بعد الطهور

ما تحتاج إلى معرفته:

- من الطبيعي رؤية بضع قطرات من الدم من الجرح. غالبًا ما يتوقف النزيف من تلقاء نفسه أو بعد بضع دقائق من الضغط المباشر بلطف. إذا استمر النزيف بشدة، يجب فحصه من قبل الطبيب.
- عادةً ما يستغرق شفاء الطهور من 7 إلى 10 أيام. من المحتمل أن يكون رأس العضو مؤلمًا في البداية، وقد يظهر متغير اللون أو منتفخًا أو به كدمات. قد تلاحظ كمية صغيرة من السائل الأصفر على طرفه.

يرجى اتباع التعليمات التالية:

- قيّم مستوى الألم لدى الطفل وقدم له وسائل الراحة اللازمة مثل اللف بالقماط، الرضاعة الطبيعية، التلامس الجسدي أو إعطاء المسكنات حسب وصف الطبيب.
- راقب التبول الأول بعد الطهور، والذي يجب أن يحدث خلال 6-8 ساعات بعد العملية.
- ضع كمية صغيرة من المرهم العلاجي حسب وصف الطبيب على مكان الطهور وغطه بضمادة نظيفة ومعقمة.
- تأكد من أن الحفاضة تكون فضفاضة لتجنب الضغط على منطقة الطهور.
- غير ضمادة الشاش مع كل تغيير للحفاضة خلال الـ 24-48 ساعة الأولى بعد العملية أو حسب توجيهات الطبيب.
- نظف منطقة الختان بلطف بالماء الدافئ أثناء تغيير الحفاضات. تجنب استخدام الصابون أو المناديل المبللة بالكحول، حيث قد تسبب تهيجًا.
- جفف المنطقة بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة ونظيفة. لا تفرك المنطقة، لأن ذلك قد يسبب إزعاجًا أو يؤثر على عملية الشفاء.

الرجاء تجنب ما يلي:

- عدم نزع الشاش بالقوة في حال التصق بالطهور والتوجه لعمل مغس بالماء الدافئ.

الرجاء الاتصال بالطبيب فورًا في حال لاحظت أي من العوارض التالية:

- زيادة الاحمرار
- التورم
- إفراز رائحة كريهة
- ارتفاع في درجة الحرارة، .