



Orchiopexy

الخصية المعلقة



Discharge Instructions for Baby Post-Orchiopexy Surgery

Overview

- Your baby has successfully undergone orchiopexy surgery, a procedure to correct an undescended testicle. Proper post-operative care at home is essential to ensure a smooth recovery, prevent complications, and maintain the surgical outcome.
- Usually, the wound is closed with Steri-Strips™ (small white strips that help close the edges of the wound). They should fall off about 7-14 days after surgery.
- There are usually **sutures** (stitches) on the scrotum. These should dissolve on their own. They do not need to be removed.
- It is normal to see swelling and bruising around the incision and in the scrotum. A small amount of drainage is also normal.

Please Follow the Instructions Below:

- **Keep the Surgical Site Clean and Dry:** Follow the doctor's instructions on how to clean the area and apply any prescribed ointments. Change dressings as directed. You can remove Steri-Strips when they start to peel off.
- **Administer Prescribed Medications:** Give all medications, including pain relievers and antibiotics, as directed by the doctor.
- Give your baby baths 2 days after surgery using a sponge to keep them clean without wetting the surgical site. After that, you can place your child in a warm bathtub. This will help with healing and swelling.
- Dress your baby in loose-fitting clothing to reduce pressure on the surgical site.
- Ensure your baby drinks plenty of fluids to stay hydrated and support healing.
- offer easily digestible foods
- Keep all scheduled follow-up appointments with the doctor to monitor your baby's healing and address any concerns. Bring your child's health record to follow-up appointments or in case of emergency care.

Please Avoid the Following:

- **Tight** clothing or diapers that might rub against the surgical site.
- engaging in **Strenuous** activities that could put pressure on the groin area such as a bicycle for 3 weeks after surgery.
- **Applying** creams, powders, or ointments on the surgical site unless prescribed by the doctor.
- **Submerging in Water** (e.g., baths, swimming pools) until the doctor provides clearance.
- crowded places and people with flu symptoms
-

Please Contact the Doctor in the Following Cases:

- **Signs of Infection:** Redness, swelling, or discharge from the surgical site, or if your baby develops a fever greater than 38°C that does not improve with medication.
- **Severe Pain:** Pain that is not relieved by prescribed pain medications or is getting worse.
- **Difficulty Urinating**
- Not urinating for 6-8 hours or small amount of dark colored urine
- **Bleeding:** Any bleeding from the surgical site
- **Signs of Infection:** Such as lethargy, irritability, or poor feeding

تعليمات الخروج للطفل بعد جراحة إصلاح الخصية المعلقة

نظرة عامة

- لقد خضع طفلك بنجاح لجراحة إصلاح الخصية المعلقة، وهي عملية جراحية لتصحيح وضع الخصية الغير نازلة. الرعاية المناسبة بعد العملية في المنزل ضرورية لضمان التعافي السلس، والوقاية من المضاعفات، والحفاظ على نتيجة الجراحة
- عادةً ما يتم إغلاق الجرح باستخدام شريط steri-strips (أشرطة بيضاء صغيرة تساعد في إغلاق حواف الجرح). يجب أن تسقط هذه الأشرطة بعد 7-14 يومًا من الجراحة
- عادةً ما تكون هناك غرز (خيوط جراحية) على الصفن. يجب أن تذوب هذه الغرز من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى الإزالة
- من الطبيعي رؤية تورم وكدمات حول الشق وفي الصفن. كما أن خروج كمية صغيرة من السوائل يعتبر أمرًا طبيعيًا.

يُرجى اتباع التعليمات التالية:

- حافظ على نظافة وجفاف الموقع الجراحي: اتبع تعليمات الطبيب حول كيفية تنظيف المنطقة وتطبيق أي مراهم موصوفة. قم بتغيير الضمادات حسب التوجيهات. يمكنك إزالة شريط steri-strips عند بدء تقشيرها
- إعطي طفلك الأدوية كما وصفها الطبيب، كالمسكنات والمضادات الحيوية، التزم بتوجيهات الطبيب بالنسبة للجرعات والمواعيت
- حم طفلك بعد يومين من الجراحة باستخدام إسفنجة للحفاظ على نظافته دون ترطيب الموقع الجراحي. بعد ذلك بإمكانك عمل مغاطس بالماء الدافئ لمساعدة طفلك في الشفاء وتقليل التورم
- ألبس طفلك ملابس فضفاضة لتقليل الضغط على الموقع الجراحي
- تأكد من أن طفلك يشرب الكثير من السوائل للبقاء رطبًا ودعم عملية الشفاء
- أطعم طفلك أطعمة سهلة الهضم
- التزم بحضور جميع مواعيد المتابعة المحددة مع الطبيب لمراقبة شفاء طفلك ومعالجة أي مخاوف. أحضر سجل صحة طفلك لمواعيد المتابعة أو في حالة الرعاية الطارئة.

يُرجى تجنب ما يلي:

- الملابس الضيقة أو الحفاضات التي قد تحتك بالموقع الجراحي
- ممارسة الأنشطة التي قد تضغط على منطقة الفخذ مثل ركوب الدراجة لمدة 3 أسابيع بعد الجراحة
- تطبيق أي مرهم أو كريمات أو مساحيق على الموقع الجراحي ما لم يصفها الطبيب
- غمر طفلك في الماء (مثل الحمامات، حمامات السباحة) حتى يمنحك الطبيب الإذن بذلك.
- الأماكن المزدحمة والناس التي لديها عوارض رشح

يُرجى الاتصال بالطبيب في الحالات التالية:

- علامات العدوى: مثل الاحمرار، التورم، أو الإفرازات من الموقع الجراحي، أو إذا أصيب طفلك بحمى أعلى من 38 درجة مئوية لا تتحسن مع الأدوية
- الألم الشديد الذي لا يتم تخفيفه بالأدوية الموصوفة ويزداد سوءًا
- صعوبة في التبول
- عدم التبول لمدة 6-8 ساعات أو كمية صغيرة من البول الداكن اللون
- النزيف: أي نزيف من الموقع الجراحي
- علامات العدوى: مثل الخمول، التهيج، أو ضعف التغذية.